

УТВЕРЖДЕНО
Директор АИЧОО ДПО «УМЦП»
Гапеева М.О.
"11" января 2017г.



Положение

О комплектации аптечки и способах применения аптечных препаратов, содержащихся в ней,

В Автономной некоммерческой частной образовательной организации дополнительного профессионального образования

«Учебно-методический центр Профсоюзов»

Настоящим утверждается наличие в аптечке данного Перечня медикаментов с инструкцией по применению.

Лекарственные средства должны быть сложены в полиэтиленовый патронташ и хранится в корпусе из медицинского полипропилена.

Не допускается произвольная замена указанных в Перечне лекарственных средств и изделий медицинского назначения и применение лекарственных средств с поврежденной маркировкой и истекшим сроком годности.

Аптечка первой помощи для оказания неотложной медицинской помощи населению подлежит своевременному пополнению.

**Состав аптечки первой помощи
для оказания неотложной медицинской помощи населению**

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество	Способ применения
Средства при болях в области сердца				
1.	Валидол таблетки 0,06 № 10	уп	1	При болях в области сердца одна таблетка сублингвально (под язык) до полного рассасывания
2.	Нитроглицерин таблетки 0,0005 № 10	уп	1	При острых болях в области сердца 1 таблетка сублингвально (под язык) до полного рассасывания
Средства при обмороке (коллапсе)				
3.	Раствор аммиака 10% - 10 мл	фл	1	При обморочных состояниях поднести небольшой кусочек ваты или марли, смоченный раствором аммиака, к носовым отверстиям (на 0,5-1 сек)
Противовоспалительные, обезболивающие средства				
4.	Ацетилсалициловая кислота таблетки 0,25 №	уп	1	При повышенной

	10			температуре по 1-2 таблетке
5.	Метамизол таблетки 0,5 № 10	уп	1	Для снятия боли по 1-2 таблетке
6.	Клемастин таблетки 1 мг	уп	1	При признаках аллергической реакции (зуд, покраснение, отек кожных покровов и слизистых оболочек) принимать по 1 таблетке

Средства при отравлениях

7.	Уголь активированный 0,25 № 10 таблетки	уп	10	При признаках отравлений (тошнота, боли в желудочно-кишечном тракте) принимается 1 таблетка из расчета на 1 кг веса, запивая обильно водой
8.	Калия перманганат 3 г	фл	1	Наружно в качестве антисептического средства - водный раствор для промывания ран, раневых поверхностей (раствор слабо-розового цвета)

Средства, применяемые при травмах (ушибы, переломы, вывихи, ожоги), ранениях

9.	Раствор йода спиртовый 5% - 10 мл	фл	1	Наружно как антисептическое средство для обработки мелких повреждений кожи (ссадин, ран, открытой раны)
10.	Раствор бриллиантового зеленого спиртовый 1% - 10 мл	фл	1	Наружно как антисептическое средство для обработки мелких повреждений кожи (ссадин, ран, вокруг открытой раны)

11.	Раствор новокаина 0,5% 5 мл № 10	уп	1	Для местной анестезии
12.	Раствор пероксида (перекиси) водорода 3% - 25 мл	фл		Наружно как дезинфицирующее средство для промывания ран и ссадин, в качестве кровоостанавливающего средства при носовых кровотечениях - небольшой кусочек ваты или марли, смоченный раствором перекиси водорода, в носовые отверстия
13.	Бинт марлевый стерильный 5x10	шт	1	Перевязочное средство, накладываемое на поверхность участков тела, при открытых ранах
14.	Салфетки марлевые стерильные 45x29	шт	1	Для наложения на открытые раны или ожоги большой площади и временной остановки поверхностного кровотечения
15.	Бинт марлевый нестерильный 5x10	шт	1	Перевязочное средство, накладываемое на поверхность участков тела, при отсутствии открытых ран или поверх стерильного бинта для его фиксации с целью иммобилизации
16.	Вата медицинская, гигроскопическая нестерильная 50 г	шт	1	Для обработки раневой поверхности растворами бриллиантового зеленого спиртового или раствором йода спиртового и для смачивания раствором аммиака
17.	Жгут кровоостанав- ливающий	шт	1	Для временной остановки кровотечения из крупных сосудов артерий конечностей. Накладывают выше места ранения, несколько раз

				обертывают вокруг конечности и закрепляют с помощью крючка или цепочки. Жгут может быть наложен не более чем на 1,5 часа. Необходимо оставить записку с указанием времени наложения жгута и закрепить на жгуте
18.	Лейкопластырь бактерицидный 2,5x7,2 3,8x3,8	шт шт	1 1	Для защиты и обеззараживания небольших повреждений кожи (ссадин, порезов, царапин). Способ применения: снять защитную пленку, на рану наложить марлевый тампон и приклеить лейкопластырь
19.	Бинт эластичный трубчатый №1, №2, №3	шт	1 1 1	Для фиксации повязок: №1 - на пальцах, кисти взрослых, а также на кисти, стопе детей; №2 - на кисти, предплечье, стопе, локтевом, лучезапястном, голеностопном суставах, а также на плече, голени, коленном суставе детей; №3 - на предплечье, плече, голени, коленном суставе взрослых, на бедре, голове детей
20.	Шприцы инъекционные одноразового использования с иглами 5мл	шт	2	
21.	Спирт этиловый 70% 30мл	фл	1	Как антисептическое и дезинфицирующее средство

Вспомогательные средства

22.	Ножницы	шт	1	
23.	Булавка	шт	5	

Необходимо наличие в аптечке данного Перечня медикаментов с инструкцией по применению.

Лекарственные средства должны быть сложены в полиэтиленовый патронташ и хранится в корпусе из медицинского полипропилена.

Не допускается произвольная замена указанных в Перечне лекарственных средств и изделий медицинского назначения и применение лекарственных средств с поврежденной маркировкой и истекшим сроком годности.

Аптечка первой помощи для оказания неотложной медицинской помощи населению подлежит своевременному пополнению.